

Lokal østrogen behandling

Revideret April 2024

Efter menopausen falder østrogenproduktionen, og det medvirker, at de østrogenfølsomme slimhinder i skede og urinrør bliver tynde, sarte, tørre, skrøbelige og modtagelige over for infektion. Surhedsgraden, pH ændres hvorved den normale bakterieflora med gunstige mælkesyrebakterier kan erstattes af tarmbakterier.

Symptomerne på lavt østrogen fra skede og urinveje kan påvirke livskvaliteten med

- Tørhed og irritation i skeden
- Smerter ved samleje
- Hyppige vandladninger
- Tvingende vandladninger
- Urininkontinens
- Gentagne urinvejsinfektioner

Disse gener kan oftest afhjælpes med at tilføre lokalt østrogen.

Der findes forskellige måder at tilføre lokalt østrogen til skeden

- Stikpiller fx Vagifem eller Rewellfem
- Creme fx Ovestin
- Vaginalring fx Estring

For dem alle gælder, at virkningen indtræder gradvis og kan først vurderes efter 3 måneders behandling. Studier viser, at forbedringerne i slimhinderne optræder helt op til 1 år efter at behandlingen er begyndt, og som hovedregel vender symptomerne tilbage, hvis lokalbehandlingen afbrydes.

Bivirkninger og risici

I den første periode kan der ses bivirkninger med brystspændinger, svie og ubehag fra skeden samt øget udflåd. Disse gener forsvinder oftest igen, når slimhinderne er genopbygget.

Lokal østrogenbehandling indebærer, at kun en meget beskedent mængde hormon optages i kroppen, svarende til hvad der er normalt for en kvinde i overgangsalderen, hvorfor denne behandling ikke synes at være forbundet med en øget risiko for kræft. Den lave østrogen tilførsel lokalt i skeden afhjælper generne fra skede og urinblære, men er ikke tilstrækkelig til at afhjælpe de andre klimakterielle symptomer som hede- og svedeture samt dårlig nattesøvn.

Hvis du tidligere har haft en blodprop eller brystkræft tilrådes du at oplyse lægen om dette, inden du starter med lokal østrogen behandling. Du kan godt anvende lokal østrogen trods tidligere blodprop og/ eller brystkræft, men der findes også hormonfrie alternativer, som anbefales at forsøge først.

