

Ansamling af pus i livmoderhulen

Revideret April 2024

Pyometra er en sjælden tilstand præget af pus i livmoderhulen. Pyometra ses hyppigst hos kvinder efter overgangsalderen.

Årsager

Det skyldes primært svækkelse af livmoderhalsens naturlige drænage gennem livmoderhalskanalen. Der findes flere forskellige årsager til denne afløbshindring fx.

- Østrogenmangel hvorved livmoderhalskanalen kan lukke til
- Polypper, muskelknuder eller andre rumopfyldende processer i underlivet
- Infektioner
- Aflukning af livmoderhalskanalen efter tidligere kirurgi eller strålebehandling
- Glemte spiral i livmoderen

Symptomer

Pyometra forårsager ofte ingen symptomer og kan findes tilfældigt ved en ultralydsskanning. Såfremt man har symptomer kan dette fx være

- Pus/ udfåd fra skeden evt. med spor af blod
- Blødning efter menopausen
- Smerter/ trykken i underlivet
- Kvalme og/ eller diarré
- Feber

Behandling

Langt de fleste kvinder kan behandles effektivt med udvidelse af livmoderhalskanalen. Der lægges lokalbedøvelse i livmoderhalsen, hvorefter man "step by step" langsomt udvider livmoderhals-kanalen, således at der skabes passage og dermed drænage af pusansamlingen.

Skulle der tilkomme kraftige smerter, blødning og/eller feber indenfor den første uge efter indgrebet skal klinikken kontaktes. Udenfor klinikkens åbningstid kontaktes egen læge eller vagtlæge.

Der gives kun Antibiotika, såfremt der er behov herfor -og da efter dyrkning og resistensbestemmelse. I nogle tilfælde kan østrogen behandling i 4 uger reducere risikoen for gendannelse.

Kontrol

Der er risiko for at Pyometra gendannes, så kontrol med ultralyd tilbydes oftest.

